

令和6年産減・減夢つくし

(5月13日 播種)
(6月5日 田植え)

栽培暦

北九州普及指導センター
J A 北 九

月別	4			5			6			7			8			9		
旬	下旬			上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
水管理																		
生育ステージ																		
管理のポイント	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 20%;"> <p>種子消毒 (温湯消毒) 60℃ 10分</p> <p>● レンゲ・菜の花鋤き込み</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>リン酸・苦土の補給に リンスター30</p> <p>30 kg</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p><基肥> (一発肥料)</p> <p>有機エムコート256 または 新スーパーユーキくん1号</p> <p>60 kg 40 kg</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>移植</p> <p>深植防止</p> <p>補植苗の除去</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>● 中干し</p> <p>溝切り</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p><追肥></p> <p>スーパーユーキくん3号</p> <p>35 kg</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>最も水が必要な時期</p> </div> <div style="width: 20%;"> <p>○ 土づくり (ヒメトビウンカ対策)</p> <p>○ 収穫後早めの耕起</p> <p>○ 落水はなるべく遅く</p> <p>堆肥投入 又は アヅミンの投入 200 kg 2 t 40 kg</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">倒伏防止・病虫害対策に、けい酸加里の使用をお勧めします。 基肥時40kg又は、中干し時20kg</p>																	
病虫害	<p>《特徴》</p> <ul style="list-style-type: none"> ☆ 夢つくしはいもち病に弱いので、いもち病の常発地や野菜後等での栽培は避ける。 ☆ 倒れやすい傾向にあるので、過剰施肥にならないよう注意する。 ☆ 穂発芽しにくい。 ☆ 食味が良い。 <p>ばか苗病、いもち病、ごま葉枯病、イネシンガレセンチュウ、白カビ、苗立枯病、葉いもち・ウンカ、イネミズゾウムシ、葉いもち、(ジヤンボタニシ) スクミリンゴガイ、縞葉枯病、ヒメトビウンカ、紋枯病、穂首いもち、ウンカ類、カメムシ</p>																	
防除農薬	<p>● 種子消毒 温湯消毒</p> <p>ベンレート水和剤 ※浸漬後しっかりと風乾させる ※少量の水でのり状に練り、規定水量と混合</p> <p>箱剤 防人箱粒剤</p> <p>初中期一発除草剤 ガンガン豆つぶ 250、ガンガンジャンボ、ガンガン1キロ粒剤 ※移植後落水・田面の均一化</p> <p>スクミンベイト3 ※発生が無い場合確認 ※発生が無くか圃場確認 ※野菜後や高温多雨時は注意</p> <p>※除草剤(補正) アトリ豆つぶ250 ※昨年縞葉枯病の発生圃場はご注意願います</p> <p>必須① 粉剤: ダブルカットバリアダ、液剤: トレボンEW、ダブルカットバリアダフロアブル</p> <p>必須② カメムシ剤: アルバリン顆粒水溶剤、アルバリン粉剤DL ※出穂後の畦畔除草はしない</p>																	
成分数	<p>① ③ ② ② ② ① ① ① ① ①</p> <p>左の成分数の合計が10成分以下</p>																	