

月		4			5			6			7			8			9					
旬		中		下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中				
普 通 期	生育 期間				は種	育 苗		田植	活着期	有効分け時期	無効分け時期	幼穂形成期			出穂期	穂揃期	登熟期間		成熟期			
	主 な 作 業							浅 水		間断灌水		中干し	間断灌水			浅 水		間断灌水		落 水		
		・土壌改良資材施用 ・温湯消毒 ・レンゲすき込み(基肥)						・箱施薬①		・田 植 ($\frac{5}{6}$~$\frac{9}{10}$) ・除草剤処理② ・落水(ガス抜き) (半日~1日程度干す 除草剤散布後7日頃)			・中干し ・溝切り ・穂 肥 (出穂前28~25日) ※田植後30日目頃から中干しを開始し、田面がやや硬くて黒く、小さな亀裂が入る程度を目安として実施する。 田面が白く、大きな亀裂が入るような強い中干しはおこなわないよう注意する。			穂いもち病 防除時期③			ウシカ・カメムシ防除④ (状況に応じて2回散布)			収 穫
水管理: 除草剤散布後7日頃落水(ガス抜き)を行い、根の機能促進と分けつ促進を図ります。 収穫適期 (黄褐色粃70~80%) 収穫早限 黄褐色粃比率70% 粃水分28%																						