


JA福岡大城の「つやおとめ」減農薬・減化学肥料栽培こよみ

合計成分数「9」まで

JA福岡大城、南筑後・久留米普及指導センター
令和7年2月作成



【施肥基準】				
(10a当たり)				
例	基肥	穂肥①8月14日頃	穂肥②8月21日頃	化成肥料由来の窒素成分
1	新スーパーユーキくん1号 30kg以下	スーパーユーキくん3号 20kg	スーパーユーキくん3号 10kg	2.96kg
2	高有機一発肥料24 60kg	なし	なし	2.84kg

※いずれの例も穂肥合計は〇〇70kg/10aまで〇〇。 ※大豆あとのほ場では基肥を入れない。

売れる「JA福岡大城のつやおとめ」重点目標

- 種子更新100%
- 田植え時期の統一
- 適正な施肥、農薬使用などの裁判管理
- 確実な栽培利益の記帳

●詳しくは下記まで連絡して下さい●
JA福岡大城（農産課）0944-32-1341
南筑後普及指導センター（水田農業係）0944-62-4191
久留米普及指導センター（水田農業係）0942-47-5101

【病虫害防除基準】			
(10a当たり)			
時期	種子消毒 播種前	箱苗防除 田植え前3日～田植え前日 フェルテラゼクサロン箱粒剤 50g/箱 ※散布後、ジョロなどで水をかけ 薬剤を落着かせる	本田防除 8月上旬～下旬 ・オーケストラロムダンモンカット粉剤DL ・オーケストラロムダンモンカットエア
使用基準	温湯消毒 60℃ 10分		
農薬成分数	0	2	3

※紋枯れ病のみの防除を行う際は、バリダシン粉剤DLを出穂期(8月中下旬)に散布します。
※ジャンボタニシにはスクミベイト成分数「0」
※苗立ち枯病対策タゲレン成分数「1」

【除草剤】			
除草剤	10a当たり使用料	使用時期	農薬使用成分数
ガソントZ フロアブル	500ml	田植え後5日～ノビエ3.0葉期まで (但し、移植後30日まで)	2
ガソントZ 1キロ粒剤	1kg		
ボデーガートプロ フロアブル	500ml		
ボデーガートプロ ジャンボ	10パック	田植え後3日～ノビエ2.5葉期まで (但し、移植後30日まで)	
ガンガン ジャンボ	10パック		

※農薬安全使用の順守 ※農薬飛散防止に努めましょう。

◆安全・安心な良食味米生産のため、施肥及び農薬散布基準を遵守しましょう。

令和7年2月更新